




بیمارستان مفرح



آموزش بعد از عمل جراحی:

- برای تخفیف درد نشستن در لگن آب گرم به مدت ۲۰ دقیقه هر ۲ الی ۴ ساعت یک بار تکرار شود.
- استفاده از گمپرس گرم برای تسکین درد
- پیشگیری از بروز یبوست (در صورت احساس اجابت مزاج، از آن خودداری نکنید، حتی اگر درد داشته باشید یبوست می تواند باعث افزایش فشار روی زخم محل جراحی شود.
- مصرف غذاهای حاوی فیبروهمچنین در صورت تجویز پزشک مصرف ملین می تواند کمک کننده باشد.

آبسه آنورکتال

بیمارستان مفرح

آدرس: نازی آباد، میدان بهمنیار،

خیابان بهمنیار

تلفن: ۰۲۱-۹۱۳۲۰۰۰۲

فکس: ۰۲۱-۹۱۳۲۲۹۶۰

پست الکترونیک:

info@mofarahhospital.com

وب سایت:

www.mofarahhospital.com

کد: PF-ED-20/01

آبسه آنورکتال:

آبسه آنورکتال یا آبسه مقعدی به تجمع چرک در پوست اطراف ناحیه مقعد می گویند. اگر به موقع درمان نشود موجب بروز سایر بیماری ها از جمله فیستول مقعد می شود. این عارضه در مردان و در افراد مبتلا به بیماری های روده شایع تر است. افراد با شرایط زیر احتمال بیشتری برای ابتلا به آبسه مقعدی دارند:

- بیماران دیابتی
- بیماری التهابی لگن
- بواسیر بیرون زده
- بیماری های التهابی مانند بیماری کرون یا کولیت اولسراتیو
- استفاده از داروهایی نظیر پردنیزولون

مهمترین نشانه های ابتلا به این عارضه:

- درد
- سوزش هنگام نشستن شدت می یابد
- تحریک پوست اطراف مقعد از جمله تورم، قرمزی، حساسیت
- اسهال
- یبوست یا درد هنگام دفع
- تب (تب معمولاً نشان دهنده ی آبسه های عمیق مقعدی می باشد)
- لرزه، بی قراری ، بی اشتها، بدن درد
- محل ایجاد آبسه به دلیل وجود عفونت معمولاً از سایر نقاط اطراف آن گرم تر است.

پیشگیری

جلوی بروز یبوست را بگیرید
از تنقیه کردن خودداری کنید

درمان

درمان شامل باز کردن آبسه و تخلیه آن است
حین جراحی از بی حسی موضعی استفاده
می شود .

برای آبسه های عمقی تر در راست روده،
معمولاً از بیهوشی عمومی استفاده می شود.