




بیمارستان مفرح

کورتاژ

***** توجه داشته باشید عمل
دیلاتاسیون و کورتاژ هیچ تاثیری در
روند زندگی شما ندارد و میتوانید بعد
از یک هفته استراحت بدون هیچ مشکلی
زندگی عادی خود را از سر بگیرید**

**در موارد زیر لازم است به پزشک خود
مراجعه نمایید:**

۱. تب
۲. ترشحات زیاد و غیر طبیعی
۳. درد زیاد در قسمت زیر شکم
۴. افزایش خونریزی
۵. ترشحات بد بو
۶. هر نوع حالت غیر طبیعی مثل سردی،
ضعف، بیحالی، تب و غیره



بیمارستان مفرح
آدرس: نازی آباد، میدان بهمنیار،
خیابان بهمنیار
تلفن: ۰۲۱-۹۱۳۲۰۰۰۲
فکس: ۰۲۱-۹۱۳۲۲۹۶۰
پست الکترونیک:
info@mofarahhospital.com
وب سایت:
www.mofarahhospital.com

کد: PF-ED-06/01

تعریف :

باز کردن دهانه ی رحم و تخلیه ی نسج آن را کورتاژ گویند . این عمل یکی از شایعترین عمل های زنان است، میتواند برای تشخیص یا درمان خونریزی های غیر طبیعی زنان به کار رود.

خونریزی غیر طبیعی از واژن چیست ؟

در شرایط مختلف یک زن ممکن است مشکلاتی داشته باشد که منجر به خونریزی غیر طبیعی از واژن گردد. خونریزی غیر طبیعی به خونریزی گفته میشود که در زمانی خارج از انتظار ما اتفاق بیافتد مانند :

۱. بعد از تماس جنسی
۲. هنگام یائسگی یا بعد از آن
۳. در بین دو دوره قاعدگی به صورت لکه بینی
۴. ترشح خونی از واژن یا خونریزی در نیمه ی اول حاملگی

عمل دیلاتاسیون و کورتاژ

عمل دیلاتاسیون و کورتاژ ضمن بیهوشی عمومی یا بیحسی ناحیه ای ، بعد از اینکه شما را در وضعیت مناسبی قرار دادند که دسترسی به رحم آسان باشد، انجام میشود.

ابتدا دهانه ی رحم را متسع (باز) میکنند ، در صورتیکه علت خونریزی سقط است، محصولات حاملگی را خارج می نمایند و اگر علت خونریزی نامعلوم است از بافت رحم نمونه (بیوپسی) برمی دارند.

اگر پزشک شما ناحیه ی مشکوکی را یافت، او ممکن است یک بخش یا همه آن را خارج کند و به آزمایشگاه بفرستد. یک آسیب شناس بافت را زیر میکروسکوپ آزمایش میکند، تا سرطان یا دیگر بیماری های احتمالی را تشخیص دهد .

مراقبت بعد از عمل

قبل از موارد زیر حتماً با پزشک خود مشورت کنید :

- ۱) انجام کارهای سنگین بعد از عمل جراحی
- ۲) داشتن تماس جنسی بعد از عمل جراحی

در صورتیکه عمل شما برای خارج کردن بقایای حاملگی انجام شده، در صورت تمایل به بارداری مجدد لازم است حاملگی خود را تا ۶ ماه به تاخیر اندازید تا رحم شما آمادگی لازم را پیدا کند و تصمیم گیری برای بارداری مجدد حتماً تحت نظر پزشک متخصص زنان انجام شود.

ممکن است بارداری مجدد حتی دو هفته بعد از سقط انجام گیرد. برای جلوگیری از آن لازم است با پزشک خود مشورت نموده و روش مناسب و مطمئنی را برای جلوگیری از بارداری انتخاب نمایید.

بعد از کورتاژ لازم است، قرص های آهن تجویز شده توسط پزشک را به مدت ۳ ماه جبراً کم خونی خود استفاده نمایید.